

【予防接種の種類と対象】

	種類	対象年齢	標準的な接種年齢	回数	その他
経口 生	ロタウイルス	1 価 生後6週～ 生後24週になる前日	初回：生後2ヶ月～生後15週 になる前日までに開始 4週間以上の間隔をおく	2回	※腸重積症のリスクを避けるため、 初回接種は生後15週になる前日 までに行いましょう
		5 価 生後6週～ 生後32週になる前日		3回	
不活	小児肺炎球菌	生後2ヶ月～ 5歳の誕生日の前日	初回：生後2ヶ月～7ヶ月に なる前日までに開始 27日以上の間隔をおく (1歳までに初回3回を完了する) 追加：1歳～1歳3ヶ月の間 初回接種の最後の接種終了後、 60日以上の間隔をおく	開始が 生後2ヶ月～ 7ヶ月になる前日 初回3回 追加1回	※初回接種の2回目が1歳を超える場合、 初回接種3回目の接種は行わず、60日 以上の間隔をおいて、追加接種を行う ※初回接種の2回目及び3回目の接種が、 2歳を超える場合は接種せず、最終接種 から60日以上の間隔をおいて、追加 接種として1回行う
				開始が 生後7ヶ月～ 1歳誕生日の前日 初回2回 追加1回	・初回：2歳誕生日の前日までに、27日 以上の間隔をおいて接種 ・追加：初回接種の最後の接種終了後、60 日以上の間隔をおいて1歳以降に行う ※初回接種2回目の接種が2歳を超える 場合は接種せず、最終接種から60日 以上の間隔をおいて、追加接種を行う
				開始が1歳～ 2歳誕生日の前日 2回	60日以上の間隔をおく
				開始が2歳以降 1回	－
不活	B型肝炎	1歳の誕生日の前日まで	生後2ヶ月～9ヶ月になる前日 2回目：1回目から27日以上 の間隔をおく 3回目：1回目から139日以上 (約5ヶ月)の間隔をおく	3回	3回接種完了するまでに約半年かかります 1歳までに3回接種完了するために、生後 2ヶ月から接種開始をお勧めします
生	BCG	1歳の誕生日の前日まで	生後5ヶ月～8ヶ月になる前日	1回	－
不活	ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ	1 期 生後2ヶ月～ 7歳6ヶ月になる前日	初回： 生後2ヶ月～1歳の誕生日前日 20日以上の間隔をおく 追加：初回接種(3回)終了後、 1年～1年半までの間隔をおく	3回	接種方法は皮下または筋肉内接種のいずれかになり ます。
不活	ジフテリア 破傷風	2 期 11歳～13歳の誕生日 の前日まで	11歳	1回	※対象となる時期にお知らせが届きます
生	麻疹 風疹	1 期 1歳～2歳の誕生日の前日	1歳の誕生日後なるべく早めに	1回	－
		2 期 小学校就学前の1年(年長児)	年長児	1回	※年長児となる4月頃にお知らせが届きます
生	水痘	1歳～3歳の誕生日の前日	1回目：1歳～1歳3ヶ月未満 2回目：1回目接種終了後、 6ヶ月～1年までの間隔をおく	1回	－
				1回 初回接種終了後3ヶ月以上	－
不活	日本脳炎	1 期 生後6ヶ月～ 7歳6ヶ月になる前日	初回：3歳 6日以上、28日までの間隔をおく 追加：4歳 初回接種(2回)終了後、6ヶ月 以上おおむね1年の間隔をおく	2回	※特例措置がありますので詳しくはお問い 合わせください
		2 期 9歳～13歳の誕生日の前日	9歳	1回	※2期は対象となる時期にお知らせが 届きます
不活	子宮頸がん	小学6年生の4月1日～ 高校1年生の3月31日まで	中学1年生	3回	・2価：1ヶ月以上の間隔をおいて1回目と2回 目を接種後、1回目の接種から5ヶ月以上、かつ 2回目の接種から2ヶ月半以上の間隔をおいて3 回目を接種 ・4価：1ヶ月以上の間隔をおいて2回 接種した後、2回目の接種から3ヶ月 以上の間隔をおいて3回目を接種 ・9価：1回目の接種を15歳以上で接種 する場合、2ヶ月の間隔をおいて2回目を 接種後、1回目の接種から6ヶ月の間隔を 置いて3回目を接種。
				2回	・9価：1回目の接種を15歳未満で接種 する場合、1回目の接種から6か月の間隔 を置いて2回目を接種

接種 間隔	注射生ワクチン → 別の種類の注射生ワクチン	27日以上あける(※1)
	注射生ワクチン → 注射生ワクチン以外のワクチン	制限なし
	不活化ワクチン → 別の種類の全てのワクチン	

(※1) 月曜日に接種した場合、4週間後の月曜日(27日以上あける)の接種が可能です。

※ 同一ワクチンの接種においては、それぞれ決められた接種間隔で実施すること。