

【予防接種の種類と対象】

ワクチンの種類	種類	対象年齢	標準的な接種年齢	回数	その他	
経口 生	ロタウイルス	1価 (097タイプ)	生後6週～ 生後24週になる前日	初回：生後2ヶ月～生後1.5週 になる前日までに開始 4週間以上の間隔をおく	2回	※腸重症症のリスクを避けるため、初回 接種は生後1.5週になる前日までに 行いましょう。
		5価 (097タイプ)	生後6週～ 生後32週になる前日		3回	
不活	小児肺炎 球菌	生後2ヶ月～ 5歳の誕生日の前日	初回：生後2ヶ月～7ヶ月に なる前日までに開始 27日以上の間隔をおく (1歳までに初回3回を完了する) 追加：1歳～1歳3ヶ月の間 初回接種の最後の接種終了後、 60日以上の間隔をおく	開始が 生後2ヶ月～ 7ヶ月になる前 日	初回3回 追加1回	※初回接種の2回目が1歳を超える場合、 初回接種3回目の接種は行わず、60日 以上の間隔をおいて、追加接種を行う ※初回接種の2回目及び3回目の接種が、 2歳を超える場合は接種せず、最終接種 から60日以上の間隔をおいて、追加接 種として1回行う
				開始が 生後7ヶ月～ 1歳誕生日の前 日	初回2回 追加1回	・初回：2歳誕生日の前日までに、27日 以上の間隔をおいて接種 ・追加：初回接種の最後の接種終了後、 60日以上の間隔をおいて1歳以降に行う ※初回接種2回目の接種が2歳を超える 場合は接種せず、最終接種から60日 以上の間隔をおいて、追加接種を行う
				開始が 1歳～2歳 誕生日の前日	2回	60日以上の間隔をおく
				開始が2歳以降	1回	—
生	日型肝炎	1歳の誕生日の前日まで	生後2ヶ月～9ヶ月になる前日 2回目：1回目から27日以上 の間隔をおく 3回目：1回目から139日以上 (約5ヶ月)の間隔をおく	3回	3回接種完了するまでに約半年かかります。 1歳までに3回接種完了するために、生後 2ヶ月から接種開始をお勧めします。	
生	BCG	1歳の誕生日の前日まで	生後5ヶ月～8ヶ月になる前日	1回	—	
不活	5種混合 ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリ ヒブ	1期 生後2ヶ月～ 7歳6ヶ月になる前日	初回： 生後2ヶ月～1歳の誕生日前日 20日以上の間隔をおく	3回	接種方法は皮下または筋肉内接種のいずれ かになります。	
			追加：初回接種(3回)終了後、 1年～1年半までの間隔をおく	1回 初回接種終了後6ヶ月以上		
不活	2種混合 ジフテリア 破傷風	2期 11歳～13歳の 誕生日の前日まで	11歳	1回	※対象となる時期にお知らせが届きま す。	
生	麻しん 風しん	1期 1歳～2歳の誕生日 の前日	1歳の誕生日後なるべく早めに	1回	※2期は年長児となる4月頃にお知らせ が届きます。	
		2期 小学校就学前の1年 (年長児)	年長児	1回		
生	水痘	1歳～3歳の誕生日の前日	1回目：1歳～1歳3ヶ月未満	1回	—	
			2回目：1回目接種終了後、 6ヶ月～1年までの間隔をおく	1回 初回接種終了後3ヶ月以上		
不活	日本脳炎	1期 生後6ヶ月～ 7歳6ヶ月になる前日	初回：3歳 6日以上、28日までの間隔を おく 追加：4歳 初回接種(2回)終了後、6ヶ月 以上おおむね1年の間隔をおく	2回	※特例措置がありますので詳しくはお問い 合わせください。 ※2期は対象となる時期にお知らせが 届きます。	
			2期 9歳～13歳の 誕生日の前日	9歳		1回
		2期 9歳～13歳の 誕生日の前日	9歳	1回		
不活	子宮頸がん	小学6年生の4月1日～ 高校1年生の3月31日まで	中学1年生	開始が 15歳未満	2回	1回目の接種を15歳未満で接種する場 合、1回目の接種から6か月の間隔を置いて2回目を接種
				開始が 15歳以上	3回	1回目の接種を15歳以上で接種する場 合、2ヶ月の間隔をおいて2回目を接種 後、1回目の接種から6ヶ月の間隔を置いて3回目を接種。

接種 間隔	注射生ワクチン → 別の種類の注射生ワクチン	27日以上あける(*1)
	注射生ワクチン → 注射生ワクチン以外のワクチン	制限なし
	不活化ワクチン → 別の種類の全てのワクチン	

(*1) 月曜日に摂取した場合、4週間後の月曜日(27日以上あける)の接種が可能です。
※同一ワクチンの接種においては、それぞれ決められた接種間隔で実施すること。